Название рубрики

Эффекты селена в составе консервативной терапии болезни Грейвса**Шабалина Е.А. *, Фадеев В.В.***ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия*

Несмотря на противоречивые результаты недавно проведенных исследований селена (Se) при болезни Грейвса (БГ), адьювантная роль микроэлемента при данном заболевании продолжает исследоваться.

Целью данной работы являлось изучение эффектов селенметионина в составе консервативной терапии БГ.

Методы. В исследование были включены 28 пациенток в возрасте от 19 до 52 лет с впервые выявленной БГ легкого или среднетяжелого течения, которым планировалось проведение тиреостатической терапии в течение 12 мес. Пациентки были рандомизированы в две группы терапии: 1) тиреостатическая терапия + Se (200 мкг); 2) тиреостатическая терапия. Исходно и каждые 3 мес наблюдения оценивались показатели: ТТГ, св.Т₄, св.Т₃, АТ-ТПО и АТ-рТТГ, также проводилось УЗИ щитовидной железы (ЩЖ), оценивались объем и эхогенность паренхимы ЩЖ. Период наблюдения составил 18 мес (12 мес терапии, 6 мес наблюдения после отмены тиреостатической терапии, Se отменялся после 15 мес наблюдения).

Результаты. В нашем исследовании не получено статистически значимых отличий между группами терапии БГ по скорости достижения эутиреоза, динамике показателей АТ-рТТГ и АТ-ТПО в течение всего периода наблюдения, частоте развития рецидива заболевания в течение 6 мес после отмены терапии.

Выводы. Согласно данным нашего исследования, применение Se в фармакологических дозах (200 мкг в сутки) в рамках комплексной терапии БГ в течение 12 мес не приводило к статистически значимому эффекту в отношении клинических исходов БГ, а также не сопровождалось положительным “аутоиммунным” эффектом.

Ключевые слова: селен, болезнь Грейвса, щитовидная железа.

Effects of selenium in patients with Graves' disease treated with antithyroid drugs**Elena A. Shabalina *, Valentin V. Fadeyev***I.M. Setchenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia*

In spite of previous conflicting results, an adjuvant role of selenium in the treatment of Graves' disease (GD) hyperthyroidism has been proposed.

The aim of our study was to assess the effects of selenomethionine added to antithyroid drug therapy in patients with GD.

Methods. Twenty eight newly diagnosed hyperthyroid GD (mild or moderate severity) patients were randomly assigned to treatment during 12 months with: 1) thiomazole and levothyroxine + selenium or 2) thiomazole and levothyroxine. At base line and every 3 months the levels of TSH, fT₄, fT₃, TPO Ab, TRAb were measured. For the thyroid tissue echogenicity assessment thyroid ultrasound was performed. Follow-up period lasted 18 months (12 months of antithyroid therapy, 6 month after withdrawal of antithyroid therapy, selenium was withdrawn after 15 months of therapy).

Results. There were no significant difference between the groups in biochemical restoration of hyperthyroidism, titers of TPO Ab and TRAb during the whole observational period. There were also no difference between the treatment groups in rate of relapse after the withdrawal of treatment.

Conclusions. Our study, failed to show an adjuvant role of selenium in the control of hyperthyroidism in patients with newly diagnosed GD.

Key words: selenium, Graves' disease, thyroid.

Актуальность

Болезнь Грейвса (БГ) представляет собой аутоиммунное заболевание щитовидной железы (ЩЖ) проявляющееся гипертиреозом, развивающимся вследствие воздействия специфических аутоантител на рецептор к тиреотропному гормону (АТ-рТТГ). Заболевание встречается у лиц различного возраста,

в 5–10 раз чаще у женщин, чем у мужчин. На сегодняшний день существует три варианта терапии БГ: 1) тиреостатические препараты (тиамазол, пропилтиоурацил); 2) тиреоидэктомия и 3) терапия радиоактивным йодом, в исходе которой, как и после тиреоидэктомии, развивается гипотиреоз. В Европе первичным вариантом терапии обычно является лечение

тиреостатическими препаратами, которое проводится в течение 12–18 мес с последующей отменой препаратов. Однако менее чем у 50% пациентов, получавших тиреостатическую терапию, будет наблюдаться длительная ремиссия заболевания [1]. Селен (Se) является жизненно важным микроэлементом для здоровья человека. Основными пищевыми источниками Se являются мясо и мясные продукты (31%), рыба и моллюски (20%), паста и рис (12%), хлеб и зерновые культуры (11%), а самое большое содержание Se (более 1 мг/кг) определяется в бразильских орехах и отрубях [2]. В Европе среднее потребление Se составляет 40 мкг/сут (32–62 мкг/сут), в США – 93 мкг/сут для женщин и 134 мкг/сут для мужчин [3]. Верхний допустимый уровень потребления Se составляет 400 мкг/сут в США [4] и 300 мкг/сут в Европе [5]. Все описанные на сегодняшний день биологические эффекты Se на организм человека осуществляются через экспрессию 30 селенопротеинов (содержат в своем активном центре селеноцистеин), кодируемых 25 соответствующими генами [6]. Большинство из них имеет четко определенную функцию: 1) участие в поддержании окислительного баланса клетки – глутатионпероксидаза, тиоредоксин редуктаза; 2) ингибирование апоптоза и регуляция клеточного роста (снижение уровня тиоредоксина); 3) превращение T_4 в реверсивный или активный T_3 – дейодиназы 1 и 2 типов.

Среди различных органов человека ЩЖ занимает первое место по содержанию Se на грамм ткани [7]. Несколько селеноцистеинсодержащих протеинов экспрессировано в ЩЖ, в основном в тиреоцитах. К этим протеинам относятся три формы глутатионпероксидаз (сGPx, рGPx, PH-GPx), 5-дейодиназа 1 типа и селенопротеин Р [7]. Поскольку тиреоциты постоянно активно выделяют перекись водорода, необходимо присутствие эффективной системы защиты против действия перекиси водорода и свободных радикалов, образующихся в ходе окислительных реакций. БГ характеризуется состоянием оксидативного стресса не только в тиреотоксической, но и в эутиреоидной фазе, достигнутой за счет приема препаратов из группы тиреостатиков [8], а также увеличением активности антиоксидантных систем. Подтверждением вышесказанного является обнаружение достоверно более высоких концентраций мочевого малондиальдегида (маркер оксидативного стресса) у пациентов с БГ по сравнению с группой контроля [9].

Согласно имеющимся на сегодняшний день данным (многоцентровое исследование, 159 пациентов), применение 200 мкг селенита натрия в сутки приводило к улучшению качества жизни, связанного

с заболеванием, и снижению выраженности глазных симптомов у пациентов с легкой офтальмопатией Грейвса без тиреотоксикоза [10]. В исследовании Т. Wertenbruch и соавт. (2007) было проведено сравнение концентрации Se в сыворотке крови у пациентов с рецидивом и ремиссией БГ. Исследователи отметили, что высокая концентрация Se в сыворотке крови (более 120 мкг/л) была обнаружена у пациентов в группе ремиссии, предполагая тем самым позитивное влияние высокого уровня Se на исход терапии БГ. В дополнение к этому авторы показали обратную корреляцию между концентрацией Se в сыворотке крови и уровнем АТ-рТТГ у пациентов в группе ремиссии, чего не наблюдалось в группе рецидива заболевания. Учитывая полученные данные, исследователи сделали предположение о возможном позитивном влиянии Se на течение аутоиммунного процесса при БГ [11].

В исследовании, проведенном в Хорватии, пациентам с БГ, получавшим лечение метимазолом, к терапии был добавлен фиксированный комплекс антиоксидантов (витамины С и Е, бета-каротин и селен) с целью определения его влияния на активность супероксиддисмутазы, концентрации цинка и меди в эритроцитах [12]. В ходе исследования отмечено более быстрое наступление эутиреоза у пациентов, принимавших метимазол и антиоксидантный комплекс, по сравнению с пациентами, получавшими метимазол. Авторы наблюдали одинаковое снижение активности супероксиддисмутазы у пациентов в обеих группах, в то время как в группе, дополнительно принимавшей антиоксидантный комплекс, было отмечено улучшение показателей антиоксидантной системы эритроцитов.

I. Pedersen и соавт. в своем исследовании сравнивали концентрации Se в сыворотке крови у пациентов с впервые выявленной БГ и здоровых людей [13]. По результатам исследования, в группе БГ концентрация Se в сыворотке крови была достоверно ниже в сравнении с контрольной группой.

В 2015 г. в Стокгольме было проведено исследование, целью которого являлась оценка влияния фармакотерапии Se на иммунные механизмы, уровень тиреоидных гормонов, депрессии и тревоги у пациентов с БГ [14]. В исследование были включены 38 пациентов с впервые выявленной БГ, которые ранее не получали терапию. Пациенты были рандомизированы в две группы терапии: 1) тиреостатическая терапия по схеме “блокируй–замещай” + 200 мкг Se; 2) тиреостатическая терапия по схеме “блокируй–замещай” + плацебо. Оценивались уровни тиреотропного гормона (ТТГ), св. T_4 , св. T_3 , антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), АТ-рТТГ исходно и через 6, 18, 36 нед терапии. Исходно и через 36 нед

терапии через опросники оценивался уровень депрессии и тревоги, а также симптомы заболевания. В группе Se отмечалось достоверно более значимое снижение уровней св.Т₄ на 18-й и 36-й неделях терапии, уровень ТТГ достоверно более значимо возрос в группе Se на 18-й неделе терапии. Выраженность депрессии и тревоги по шкале была сопоставима в обеих группах терапии, однако в группе Se отмечалась отрицательная корреляция между частотой развития депрессии и уровнем св.Т₃ и положительная корреляция между уровнем ТТГ и частотой развития депрессии. Таким образом, авторы пришли к заключению, что применение Se может приводить к улучшению биохимической компенсации тиреотоксикоза, в то время как для оценки влияния микроэлемента на динамику симптомов тиреотоксикоза и ментальные симптомы требуются дальнейшие исследования.

Совсем недавно были опубликованы результаты трехмесячного итальянского исследования, в котором исследовались краткосрочные эффекты Se на фоне консервативной терапии БГ [15]. В исследование были включены 30 пациентов с впервые выявленной БГ и исходно адекватной концентрацией Se в сыворотке крови (@100 нг/мл), которые были рандомизированы в две группы терапии: 1) метимазол + Se (в среднем 166 мкг/сут); 2) метимазол. В качестве первичных конечных точек через 90 дней терапии оценивались: контроль тиреотоксикоза (главным образом св.Т₃ и св.Т₄), клинические и другие биохимические признаки тиреотоксикоза (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, общий холестерин, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), шкала оценки симптомов тиреотоксикоза). В качестве вторичных конечных точек оценивались: контроль тиреотоксикоза, а также клинические и другие биохимические признаки тиреотоксикоза через 45 дней терапии; концентрация Se в сыворотке крови, малондальдегида, показатели окислительного стресса; нежелательные явления на фоне приема Se через 45 и 90 дней терапии. Как через 45, так и через 90 дней терапии не отмечалось статистически достоверных отличий между группами по динамике компенсации тиреотоксикоза (св.Т₃ и св.Т₄, ТТГ), уровней АТ-рТТГ, ЧСС, массы тела, ГСПГ, общего холестерина, малондальдегида. В группе пациентов, принимавших Se, отмечалось увеличение концентрации Se в сыворотке крови, которое сохранялось на достоверно более высоком уровне в течение 90 дней терапии.

На сайте ClinicalTrials.gov найдено одно продолжающееся клиническое исследование Se при БГ: NCT01611896 (492 пациента), исследование GRASS, в котором в качестве первичной конечной точки

будет оцениваться частота рецидива БГ у пациентов, получающих тиреостатическую терапию + Se, в сравнении с пациентами, получающими тиреостатическую терапию (через 24 и 30 мес наблюдения). В качестве вторичной конечной точки будут оцениваться: качество жизни пациентов в течение первого года после рандомизации, концентрация АТ-рТТГ через 18, 24 и 30 мес после рандомизации; симптомы тиреотоксикоза в течение первого года после рандомизации; глазные симптомы в течение первого года после рандомизации, а также через 18 и 24 мес наблюдения; нежелательные явления в течение всего периода наблюдения; тяжелые нежелательные явления в течение всего периода наблюдения.

Суммируя вышесказанное, можно высказать предположение о возможном позитивном влиянии соединений Se на исход терапии БГ, для подтверждения которого необходимо проведение целого ряда краткосрочных и длительных исследований.

Цель

Изучить эффекты селенметионина в рамках консервативной терапии БГ.

Методы

В исследование были включены 28 пациенток в возрасте от 19 до 52 лет с впервые выявленной БГ легкого или среднетяжелого течения, которым планировалось проведение тиреостатической терапии в течение 12 мес. Критериями исключения из исследования являлись: беременность и кормление грудью, тяжелое течение заболевания, объем ЩЖ более 40 мл, наличие сопутствующей тяжелой эндокринной офтальмопатии (требующей лечения глюкокортикоидами), тяжелая полиорганная патология, психологический статус пациентки, не позволяющий понять сущность и цели участия в исследовании, отказ от участия в исследовании, в том числе без объяснения причины. У каждой пациентки было получено информированное письменное согласие на участие в исследовании, после чего пациентки с помощью открытой блоковой рандомизации с использованием таблицы случайных чисел были разделены на две группы: пациентки основной группы ($n = 14$), которые помимо тиреостатической терапии получали селен (L-селенметионин) (Se) 200 мкг/сут в виде биологически активной добавки к пище ежедневно в один из приемов пищи и женщины контрольной группы ($n = 14$), которые на протяжении исследования получали тиреостатическую терапию. У всех пациенток проводилась тиреостатическая терапия по схеме “блокируй—замещай” в течение 12 мес, в качестве тиреостатического препарата во всех случаях применялся тирозол.

Какой
символ?

Рис. 1. Дизайн исследования.

Исходно и каждые 3 мес наблюдения оценивались показатели: ТТГ, св.Т₄, св.Т₃, АТ-ТПО и АТ-рТТГ, также проводилось УЗИ щитовидной железы, оценивались объем и эхогенность паренхимы ЩЖ. Период наблюдения составил 18 мес (12 мес терапии, 6 мес наблюдения после отмены тиреостатической терапии, Se отменялся после 15 мес наблюдения). Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Из 28 включенных в исследование пациенток 27 завершили исследование. Одна пациентка выбыла на 10-м месяце наблюдения по причине наступившей беременности (отмена комбинированного орального контрацептива по собственной инициативе).

Лабораторные методы

- Тиреотропный гормон (ТТГ) определялся иммунохемилюминесцентным методом с помощью набора Immulite (США); норма 0,4–4,0 мкМЕ/мл.
- Свободный тетрайодтиронин (св.Т₄) определялся иммунохемилюминесцентным методом с помощью набора Immulite (США); норма 11,5–23,2 пмоль/л.
- Свободный трийодтиронин (св.Т₃) определялся иммунохемилюминесцентным методом с помощью набора Bayer-ACS:180 (Германия); норма 3,5–6,5 пмоль/л.
- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) определялись иммуноферментным методом с помощью набора “Хема-Медика” (Россия); норма 0–60 МЕ/мл.

• Антитела к рецепторам ТТГ(2) (АТ-рТТГ) определялись радиорецепторным методом с помощью набора CIS Bio International (Франция); норма 0–1 МЕ/л.

Инструментальные методы

Ультразвуковое исследование (УЗИ) ЩЗ проводили аппаратом Hitachi EUB-405 plus с линейным датчиком 7,5 МГц. Увеличенным считался объем ЩЖ, рассчитанный по формуле Брунна, превышающий 18 мл.

Статистический анализ

Проводился с использованием статистического пакета программ SPSS 17.0. Количественные непрерывные показатели проверялись на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова–Смирнова, а также по величине асимметрии и эксцесса. Качественные, дискретные количественные и количественные непрерывные при ненормальном распределении величины оценивались методами непараметрической статистики: критерии Манна–Уитни, χ^2 (хи-квадрат). Результат или разница значений считались достоверными при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Исходно по показателям ТТГ, св.Т₄, св.Т₃, АТ-ТПО, АТ-рТТГ, объему ЩЖ по данным УЗИ пациентки двух групп между собой не отличались ($p > 0,05$) (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика исходных показателей пациенток

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	Q75	Me	Q25	Q75	
Возраст, лет	34,00	27,00	41,00	35,50	26,00	50,00	0,678
ТТГ, кМЕ/мл	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1
св.Т ₃ , пмоль/л	9,12	7,40	15,40	12,30	10,60	17,90	0,089
св.Т ₄ , пмоль/л	27,35	21,90	34,30	31,45	25,80	55,80	0,26
АТ-ТПО, МЕ/мл	293,00	30,00	1300,00	450,50	151,00	1300,00	0,483
АТ-рТТГ, МЕ/л	5,50	3,24	9,60	11,60	5,39	15,00	0,312
св.Т ₄ /св.Т ₃	2,44	2,31	2,84	2,37	2,07	2,71	0,491
Объем, мл	14,80	13,70	20,70	19,00	16,00	25,80	0,301

Таблица 2. Характеристика экзогенности паренхимы щитовидной железы пациенток исходно

		Селен				Хи-квадрат/ Пирсона, <i>p</i>
		Да		Нет		
		Частота	%	Частота	%	
Эхогенность исходно	сниженная	11	78,6	13	92,9	0,472
	смешанная	2	14,3	1	7,1	
	средняя	1	7,1	0	0,0	

Также не наблюдалось достоверных отличий между группами и по эхогенности паренхимы ЩЖ (табл. 2).

Результаты

К 3-му месяцу терапии 14/14 (100%) пациенток группы Se и 13/14 (93%) пациенток из контрольной группы были компенсированы на фоне проводимой терапии. У 1/14 (7%) пациентки из контрольной группы сохранялся манифестный тиреотоксикоз по

причине нерегулярного, от случая к случаю, приема тиреостатических препаратов. На протяжении всего периода наблюдения не выявлено достоверно значимых отличий динамики показателей ТТГ, св.Т₃ (табл. 3–6; рис. 2–5), также не отмечалось статистических различий в динамике разницы изменений указанных показателей (трехмесячные интервалы) – Δ; пациентки обеих групп с одинаковой скоростью достигали показателей эутиреоза.

Таблица 3. Динамика показателей ТТГ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
ТТГ исходно	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	1,0
ТТГ 3 мес	0,2000	0,0100	1,7000	0,0100	0,0100	0,1000	0,177
ТТГ 6 мес	1,4000	0,4000	3,2000	0,9000	0,1000	1,3000	0,135
ТТГ 9 мес	2,0000	0,7000	3,5000	1,5000	0,5000	1,8000	0,223
ТТГ 12 мес	2,3500	1,4000	2,7000	0,7000	0,4000	1,9000	0,069
ТТГ 15 мес	1,0000	0,3000	1,3000	0,8500	0,5000	1,0000	0,46
ТТГ 18 мес	0,9000	0,4000	1,7000	0,6000	0,4000	0,9000	0,138

Таблица 4. Динамика разницы изменений ТТГ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
ТТГ Δ0–3	0,1900	0,0000	1,6900	0,0000	0,0000	0,0900	0,177
ТТГ Δ3–6	0,8450	0,2900	3,4000	0,7900	0,0900	1,2900	0,345
ТТГ Δ6–9	0,7500	0,4000	1,5000	0,7000	0,4000	1,3000	0,818
ТТГ Δ9–12	0,7500	0,2000	1,5000	0,7500	0,3900	1,4000	0,982
ТТГ Δ12–15	0,9950	0,5000	1,8000	0,5500	0,4000	1,3000	0,154
ТТГ Δ15–18	0,5000	0,2000	0,8900	0,3000	0,2000	0,5900	0,644

Таблица 5. Динамика показателей св.Т₃ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
св.Т ₃ исходно	9,1150	7,4000	15,4000	12,3000	10,6000	17,9000	0,089
св.Т ₃ 3 мес	5,0000	4,2000	5,3000	4,8500	4,3000	6,0000	0,836
св.Т ₃ 6 мес	4,7000	4,2000	5,1000	4,6500	4,2000	4,9000	0,927
св.Т ₃ 9 мес	4,6000	4,3000	5,1000	4,5000	4,0000	5,1000	0,549
св.Т ₃ 12 мес	4,7000	4,5000	5,0000	4,5000	4,2000	4,7000	0,299
св.Т ₃ 15 мес	4,9000	4,3000	5,1000	4,6500	4,4000	4,8000	0,613
св.Т ₃ 18 мес	5,2000	4,8000	5,4000	4,7000	4,5000	5,2000	0,079

Таблица 6. Динамика разницы изменений св.Т₃ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
св.Т ₃ Δ0–3	4,4000	3,1000	9,6000	8,2500	4,4000	11,9000	0,190
св.Т ₃ Δ3–6	0,5000	0,2000	1,0000	0,4500	0,3000	1,0000	0,963
св.Т ₃ Δ6–9	0,3000	0,1000	0,5000	0,6500	0,2000	0,9000	0,158
св.Т ₃ Δ9–12	0,3000	0,2000	0,6000	0,4500	0,2000	0,6000	0,531
св.Т ₃ Δ12–15	0,4000	0,2000	0,7000	0,2500	0,1000	0,8000	0,460
св.Т ₃ Δ15–18	0,7500	0,3000	1,3000	0,3000	0,2000	1,3000	0,321

Рис. 2. Динамика показателей ТТГ в течение 18 мес.

Рис. 3. Динамика разницы изменений ТТГ в течение 18 мес.

Рис. 4. Динамика показателей св.Т₃ в течение 18 мес. Рис. 5. Динамика разницы изменений св.Т₃ в течение 18 мес.

Таблица 7. Динамика показателей св.Т₄ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Ме	Q25	75	Ме	Q25	Q75	
св.Т ₄ исходно	27,3500	21,9000	34,3000	31,4500	25,8000	55,8000	0,260
св.Т ₄ 3 мес	15,2000	14,0000	16,9000	13,8500	11,5000	15,9000	0,161
св.Т ₄ 6 мес	14,7500	13,7000	16,3000	12,9500	12,1000	14,2000	0,015
св.Т ₄ 9 мес	14,3500	13,5000	16,2000	13,5500	11,9000	14,6000	0,129
св.Т ₄ 12 мес	14,4000	12,9000	15,2000	13,2000	12,3000	15,1000	0,312
св.Т ₄ 15 мес	14,2000	13,7000	15,4000	12,8500	11,5000	14,6000	0,098
св.Т ₄ 18 мес	16,3000	13,9000	16,8000	13,1000	12,9000	14,8000	0,008

Таблица 9. Динамика разницы изменений св.Т₄ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Ме	Q25	75	Ме	Q25	Q75	
св.Т ₄ Δ0—3	11,7500	7,2000	14,8000	16,3500	10,2000	44,3000	0,198
св.Т ₄ Δ3—6	1,8000	0,9000	3,0000	2,4000	0,7000	3,9000	0,730
св.Т ₄ Δ6—9	2,0000	0,7000	2,8000	1,0000	0,5000	3,1000	0,549
св.Т ₄ Δ9—12	1,1000	0,6000	3,2000	1,9500	1,4000	3,2000	0,279
св.Т ₄ Δ12—15	1,7500	1,3000	2,4000	2,4000	0,5000	3,6000	0,350
св.Т ₄ Δ15—18	2,0500	1,1000	3,2000	0,9500	0,3000	5,8000	0,448

Рис. 6. Динамика показателей св.Т₄ в течение 18 мес.

При оценке динамики показателя св.Т₄ (табл. 7; рис. 6) были выявлены статистически значимые отличия между группами на 6-м и 18-м месяцах наблюдения, при этом не отмечалось статистически значимых отличий между группами при анализе Δсв.Т₄ в течение 18 мес наблюдения (табл. 9; рис. 8). На этих сроках показатель св.Т₄ был достоверно выше в группе Se в сравнении с контрольной группой: на 6-м месяце 14,75 [13,7; 16,3] и 12,95 [12,1; 14,2] пмоль/л ($p = 0,015$), на 18-м месяце 16,3 [13,9; 16,8] и

Рис. 8. Динамика разницы изменений св.Т₄ в течение 18 мес.

13,1 [12,9; 14,8] пмоль/л ($p = 0,008$) соответственно. Подобные отличия были получены и при определении отношения показателей св.Т₄/св.Т₃ (табл. 8; рис. 7), а также при анализе динамики разницы изменений отношения св.Т₄/св.Т₃ (табл. 10; рис. 9). В группе Se на 3-м и 18-м месяцах наблюдения отношение св.Т₄/св.Т₃ было достоверно выше, чем в контрольной группе: на 3-м месяце 3,10 [2,85; 3,5] и 2,57 [2,18; 3,05] ($p = 0,01$), на 18-м месяце 3,06 [2,98; 3,13] и 2,79 [2,69; 2,80] ($p = 0,019$) соответственно,

Таблица 8. Динамика показателей св.Т₄/св.Т₃ в течение 18 мес

	Селен						p
	Да			Нет			
	Ме	Q25	75	Ме	Q25	Q75	
св.Т ₄ /св.Т ₃ исходно	2,4434	2,3053	2,8391	2,3715	2,0667	2,7079	0,491
св.Т ₄ /св.Т ₃ 3 мес	3,1010	2,8478	3,5000	2,5742	2,1844	3,0526	0,01
св.Т ₄ /св.Т ₃ 6 мес	3,1518	2,8913	3,5476	2,7707	2,6383	2,9524	0,073
св.Т ₄ /св.Т ₃ 9 мес	3,1647	2,8750	3,4524	2,8202	2,6000	3,1489	0,168
св.Т ₄ /св.Т ₃ 12 мес	3,0643	2,9375	3,4800	3,1390	2,8605	3,2075	0,646
св.Т ₄ /св.Т ₃ 15 мес	2,9018	2,5000	3,2766	2,7990	2,5000	3,1220	0,73
св.Т ₄ /св.Т ₃ 18 мес	3,0630	2,9792	3,1346	2,7872	2,6889	2,8043	0,019

Таблица 10. Динамика разницы изменений св.Т₄/св.Т₃ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ0–3	0,6092	0,3374	1,0390	0,8777	0,5025	1,2740	0,312
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ3–6	0,2761	0,1698	0,3348	0,3285	0,1224	0,6860	0,696
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ6–9	0,4074	0,1522	0,6000	0,2584	0,1514	0,7237	0,927
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ9–12	0,3800	0,1232	0,5754	0,3212	0,1566	0,5100	0,854
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ12–15	0,4450	0,2000	0,7400	0,5759	0,4100	0,6900	0,462
св.Т ₄ /св.Т ₃ Δ15–18	0,5725	0,2399	0,7492	0,1648	0,0304	0,3605	0,031

Рис. 7. Динамика показателей св.Т₄/св.Т₃ в течение 18 мес. Рис. 9. Динамика разницы изменений св.Т₄/св.Т₃ в течение 18 мес.

а Дсв.Т₄/св.Т₃ достоверно выше в группе Se в сравнении с контрольной группой при анализе разницы в период между 15-м и 18-м месяцами наблюдения: 0,57 [0,24; 0,75] и 0,16 [0,03; 0,36] соответственно. Тенденция к большим значениям св.Т₄ и отношения св.Т₄/св.Т₃ в группе Se в сравнении с группой контроля отмечена на разных сроках терапии, однако статистической достоверности отличия достигли лишь в указанные сроки.

На фоне проводимой терапии оценивалась динамика показателей АТ-ТПО, АТ-рТТГ, а также ΔАТ-ТПО и ΔАТ-рТТГ в обеих группах. На протяжении всего периода наблюдения в обеих группах терапии наблюдалась тенденция к снижению АТ-ТПО и АТ-рТТГ, однако не наблюдалось статистически значимых различий между группами по данным показателям и динамике разницы их изменений (табл. 11–14; рис. 10–13).

Таблица 11. Динамика показателей АТ-ТПО в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Ме	Q25	75	Ме	Q25	Q75	
АТ-ТПО исходно	293,00	30,00	1,300.00	450,50	151,00	1 300,00	0,483
АТ-ТПО 3 мес	173,00	44,00	996,00	275,00	101,00	1 300,00	0,287
АТ-ТПО 6 мес	182,50	37,00	534,00	161,00	108,00	441,00	0,713
АТ-ТПО 9 мес	176,00	36,00	435,00	147,50	117,00	287,00	0,783
АТ-ТПО 12 мес	167,00	21,00	429,00	129,00	92,00	234,00	0,945
АТ-ТПО 15 мес	229,00	28,00	286,00	112,00	74,00	406,00	0,747
АТ-ТПО 18 мес	109,00	84,00	286,00	139,50	108,00	149,00	0,611

Таблица 12. Динамика разницы изменений АТ-ТПО в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
АТ-ТПО Δ0–3	19,50	5,00	167,00	12,50	0,00	129,00	0,341
АТ-ТПО Δ3–6	56,00	7,00	295,00	8,50	0,00	320,00	0,504
АТ-ТПО Δ6–9	28,50	19,00	100,00	27,00	15,00	93,00	0,597
АТ-ТПО Δ9–12	18,00	10,00	31,00	23,00	8,00	45,00	0,945
АТ-ТПО Δ12–15	18,00	3,00	39,00	18,50	6,00	40,00	0,963
АТ-ТПО Δ15–18	39,50	15,00	128,00	34,00	25,00	147,00	0,679

Рис. 10. Динамика показателей АТ-ТПО в течение 18 мес. **Рис. 11.** Динамика разницы изменений АТ-ТПО в течение 18 мес.

Таблица 13. Динамика показателей АТ-рТТГ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Ме	Q25	75	Ме	Q25	Q75	
АТ-рТТГ исходно	5,500	3,240	9,600	11,600	5,390	15,000	0,312
АТ-рТТГ 3 мес	2,050	1,200	3,100	5,400	1,400	12,000	0,42
АТ-рТТГ 6 мес	1,250	0,800	2,200	1,650	0,800	5,100	0,553
АТ-рТТГ 9 мес	1,000	0,800	2,400	1,950	0,800	5,000	0,407
АТ-рТТГ 12 мес	0,950	0,800	1,900	1,900	0,900	2,600	0,141
АТ-рТТГ 15 мес	0,900	0,800	1,800	1,350	0,800	2,000	0,3
АТ-рТТГ 18 мес	1,200	0,900	1,500	0,850	0,800	1,900	0,243

Таблица 14. Динамика разницы изменений АТ-рТТГ в течение 18 мес

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
АТ-рТТГ Δ0–3 мес	2,67	0,80	3,70	1,95	0,00	3,90	0,518
АТ-рТТГ Δ3–6 мес	0,70	0,40	2,30	1,35	0,00	6,40	0,678
АТ-рТТГ Δ6–9 мес	0,55	0,00	0,80	0,25	0,00	1,20	0,76
АТ-рТТГ Δ9–12 мес	0,20	0,00	0,70	1,15	0,30	2,60	0,087
АТ-рТТГ Δ12–15 мес	0,40	0,00	1,00	0,42	0,10	1,20	0,545
АТ-рТТГ Δ15–18 мес	0,40	0,00	1,00	0,50	0,00	1,10	0,762

Рис. 12. Динамика показателей АТ-рТТГ в течение 18 мес.

Рис. 13. Динамика разницы изменений АТ-рТТГ в течение 18 мес.

Таблица 15. Изменение объема ЩЖ в течение 18 мес (мл)

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
Исходно	14,8000	13,7000	20,7000	19,0000	16,0000	25,8000	0,301
3 мес	12,9500	10,8000	15,2000	16,9000	14,2000	22,0000	0,054
6 мес	12,9000	10,9300	15,3000	16,5500	12,5000	21,8000	0,175
9 мес	14,1500	10,4000	16,0000	17,0500	14,0000	25,8000	0,076
12 мес	13,8500	10,6000	18,4000	16,0000	14,5000	20,6000	0,207
15 мес	12,4000	11,2000	14,2000	15,6000	13,2000	21,8500	0,057
18 мес	13,5000	12,6000	15,4000	15,7500	14,0000	18,1000	0,192

Таблица 16. Изменение объема ЩЖ в течение 18 мес (мл)

	Селен						<i>p</i>
	Да			Нет			
	Me	Q25	75	Me	Q25	Q75	
$\Delta 0-3$ мес	3,05	1,40	7,60	2,75	1,20	5,00	0,679
$\Delta 3-6$ мес	0,85	0,40	2,52	1,30	0,50	2,40	0,818
$\Delta 6-9$ мес	1,10	0,60	2,70	0,90	0,50	4,50	0,818
$\Delta 9-12$ мес	1,75	0,40	2,40	2,00	1,20	3,14	0,323
$\Delta 12-15$ мес	1,20	0,30	1,60	1,02	1,00	1,20	0,818
$\Delta 15-18$ мес	1,40	1,20	2,40	0,90	0,80	1,10	0,004

Рис. 14. Изменение объема ЩЖ в течение 18 мес.

При оценке объема (V) ЩЖ, эхогенности паренхимы ЩЖ, ΔV ЩЖ не наблюдалось отличий между группами терапии (табл. 15, 16, 17; рис. 14, 15). В обеих группах наблюдалась тенденция к снижению V ЩЖ и изменения эхогенности паренхимы ЩЖ, свидетельствующие о снижении активности аутоиммунного процесса.

Рис. 15. Динамика разницы изменений объема ЩЖ в течение 18 мес.

Всего на момент окончания периода наблюдения было выявлено 4 рецидива БГ: 2 в группе терапии Se и 2 случая в контрольной группе. Средний срок развития рецидива составил 3,25 (1,0; 6,0) в обеих исследуемых группах. Статистически значимой разницы в частоте и сроках развития рецидива между группами не получено (табл. 18, 19).

Таблица 17. Сравнение экзогенности паренхимы ЩЖ в течение 18 мес

Эхогенность		Селен				Хи-квадрат/ Пирсона
		Да		Нет		
		Частота	%	Частота	%	
Исходно	сниженная	11	78,6	13	92,9	0,472
	смешанная	2	14,3	1	7,1	
	средняя	1	7,1	0	0	
3 мес	сниженная	9	64,3	8	57,1	0,548
	смешанная	1	7,1	3	21,4	
	средняя	4	28,6	3	21,4	
6 мес	сниженная	5	35,7	7	50,0	0,509
	смешанная	2	14,3	3	21,4	
	средняя	7	50,0	4	28,6	
9 мес	сниженная	2	14,3	7	50,0	0,069
	смешанная	1	7,1	2	14,3	
	средняя	11	78,6	5	35,7	
12 мес	сниженная	1	7,1	5	38,5	0,106
	смешанная	2	14,3	3	23,0	
	средняя	11	78,6	5	38,5	
15 мес	сниженная	2	15,4	4	33,3	0,504
	смешанная	2	15,4	3	25,0	
	средняя	9	69,2	5	41,7	
18 мес	сниженная	1	10,0	2	22,2	0,855
	смешанная	2	20,0	2	22,2	
	средняя	7	70,0	5	55,6	

Таблица 18. Частота развития рецидива БГ в группах терапии

		Селен				Хи-квадрат/ Пирсона
		Да		Нет		
		Частота	%	Частота	%	
Рецидив	да	4	28,6	4	28,6	1
	нет	10	71,4	10	71,4	

Таблица 19. Срок развития рецидива БГ в группах терапии

	Селен								<i>p</i>
	Да				Нет				
	М	Min	Max	SD	М	Min	Max	SD	
Срок рецидива	3,25	1,00	6,00	2,06	3,25	1,00	6,00	2,06	1

Обсуждение результатов

Опубликованные на сегодняшний день данные клинических исследований в отношении Se и БГ позволяют предположить положительное влияние микроэлемента на течение заболевания.

Согласно данным нашего исследования, применение Se в фармакологических дозах (200 мкг в сутки) в рамках комплексной терапии БГ в течение 12 мес не приводило к статистически значимому эффекту в отношении клинических исходов БГ, а также не сопровождалось положительным “аутоиммунным” эффектом. В нашем исследовании не получено статис-

тически значимых отличий между группами терапии БГ по скорости достижения эутиреоза, динамике показателей АТ-рТТГ и АТ-ТПО в течение всего периода наблюдения, частоте развития рецидива заболевания в течение 6 мес после отмены терапии.

Статистически значимые отличия между группами определяются при оценке динамики показателя св.Т₄, Δсв.Т₄, св.Т₄/св.Т₃, Δсв.Т₄/св.Т₃ на 3, 6, 18-м месяцах наблюдения. Возможно, при увеличении выборки пациентов указанные отличия достигли бы показателей достоверности и на других сроках терапии.

Можно предположить, что полученные отличия вызваны большим ингибированием дейодиназы 1 типа на фоне терапии тирозолом и Se в сравнении с монотерапией тиреостатиком. В работе А. Таугог и соавт. замена серы на Se в метилселеноимидазоле приводила к большему ингибированию дейодиназы 1 типа [16, 17], хотя препарат и не нашел своего применения в клинике ввиду более слабого тиреостатического эффекта в сравнении с метимазолом.

Противоречивые результаты получены в недавно проведенных исследованиях Se в комплексной терапии БГ J. Calissendorff [14] (Швеция) и M. Leo [15] (Италия). В шведском исследовании (9 мес терапии) было отмечено статистически достоверное улучшение показателей биохимического контроля тиреотоксикоза у пациентов с впервые выявленной БГ на фоне тиреостатической терапии + Se, в итальянском исследовании (3 мес терапии) статистически значимых отличий по показателям биохимического контроля тиреотоксикоза между группами метимазола + Se и метимазола не наблюдалось. Возможно, отличия в полученных результатах связаны с разной исходной концентрацией Se в сыворотке крови у пациентов в данных исследованиях: у пациентов в исследовании J. Calissendorff концентрация Se в сыворотке крови соответствовала значениям, свидетельствующим о селенодефиците, в то время как у пациентов в исследовании M. Leo значения Se в сыворотке крови соответствовали показателям достаточной обеспеченности организма микроэлементом. Как возможные причины различий в результатах можно выделить и различные терапевтические режимы (схема “блокируй—замещай” в шведском исследовании и “блокируй” в итальянском), а также различную длительность терапии пациентов.

Данные нашего исследования совпадают с данными вышеописанных исследований в отношении отсутствия отличий в динамике антитиреоидных антител (АТ-рТТГ, АТ-ТПО) между группами терапии (Se + тиреостатическая терапия vs тиреостатическая терапия).

Ни в одном из проведенных на сегодняшний день исследований не проводилась оценка влияния Se на исход консервативной терапии БГ.

За последние 10 лет в нескольких исследованиях оценивалось изменение тиреоидспецифических антител (АТ-ТПО, АТ-ТГ) на фоне приема органических и неорганических форм Se у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Результаты данных исследований очень противоречивы. В ряде из них отмечается статистически значимое снижение концентрации АТ-ТПО на фоне приема 200 мкг Se

[18, 19], в других — данный эффект не наблюдается [20]. Причина различного ответа в отношении концентрации тиреоидных антител среди исследований остается неясной. Даже при анализе тех исследований, в которых показано достоверно значимое снижение концентрации АТ-ТПО на фоне приема Se, выраженность эффекта варьирует от 10 [18] до 64% [21].

Все исследования проводились на территориях с нормальным содержанием или легким дефицитом Se в почве, поэтому причина данных отличий, вероятно, не связана с потреблением микроэлемента с пищей. Хорошо известно, что концентрация селена в крови не отражает его внутритиреоидное содержание, следовательно, при высоком содержании Se в ЩЖ дополнительный прием микроэлемента извне может не привести к изменениям в отношении активности аутоиммунного процесса в ЩЖ. Таким образом, исходное внутритиреоидное содержание Se, различное время, необходимое для насыщения микроэлементом ЩЖ среди пациентов с АИТ, а также различные метаболические потребности в Se, контролируемые на клеточном уровне, могут являться причиной расхождений в результатах различных исследований [22]. В недавно опубликованном Кохрановском систематическом обзоре, включившем 4 исследования, оценивались эффекты Se у пациентов с АИТ [23]. Результаты данного обзора не позволяют сделать однозначный вывод о применении Se при АИТ и демонстрируют необходимость дальнейшего проведения рандомизированных плацебоконтролируемых исследований Se у пациентов с АИТ.

В заключение хотелось бы отметить, что слабыми сторонами нашего исследования являются небольшой объем выборки, а также отсутствие: оценки комплаентности пациенток в отношении приема Se; определения концентрации Se в сыворотке крови; плацебо-контроля и двойного ослепления; применения шкалы оценки качества жизни пациентов.

В дальнейшем необходимо проведение большого количества рандомизированных плацебоконтролируемых исследований с хорошо спланированным дизайном, которые позволят более точно исследовать эффекты терапии Se у пациентов с БГ.

Выводы

Согласно данным нашего исследования, применение Se в фармакологических дозах (200 мкг в сутки) в рамках комплексной терапии БГ в течение 12 мес не приводило к статистически значимому эффекту в отношении клинических исходов БГ, а также не сопровождалось положительным “аутоиммунным” эффектом.

Дополнительная информация

Источники финансирования: поисково-аналитическая работа проведена на личные средства авторов.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов: Шабалина Е.А. — сбор и обработка материалов, анализ полученных данных, написание рукописи; Фадеев В.В. — концепция и дизайн исследования.

Список литературы

1. Hegedus L. Treatment of Graves' hyperthyroidism: evidence-based and emerging modalities. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2009;38(2):355-371, ix. doi: 10.1016/j.ecl.2009.01.009.
2. Kobayashi Y, Ogra Y, Ishiwata K, et al. Selenosugars are key and urinary metabolites for selenium excretion within the required to low-toxic range. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2002;99(25):15932-15936. doi: 10.1073/pnas.252610699.
3. Waegeneers N, Thiry C, De Temmerman L, Ruttens A. Predicted dietary intake of selenium by the general adult population in Belgium. *Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess*. 2013;30(2):278-285. doi: 10.1080/19440049.2012.746474.
4. Poillon F, Newberry S, editors. *Food and Nutrition Board IoM*. Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids. Washington, D.C: National Academy Press; 2000. doi: 10.17226/9810
5. Scientific Committee on Food of European Commission. *Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable upper intake level of iodine*. Bruxelles: European Commission; 2002.
6. Kryukov GV, Castellano S, Novoselov SV, et al. Characterization of mammalian selenoproteomes. *Science*. 2003;300(5624):1439-1443. doi: 10.1126/science.1083516.
7. Kohrle J. The deiodinase family: selenoenzymes regulating thyroid hormone availability and action. *Cell Mol Life Sci*. 2000;57(13-14):1853-1863. doi: 10.1007/PL00000667.
8. Ademoglu E, Ozbey N, Erbil Y, et al. Determination of oxidative stress in thyroid tissue and plasma of patients with Graves' disease. *Eur J Intern Med*. 2006;17(8):545-550. doi: 10.1016/j.ejim.2006.04.013.
9. Guerra LN, Rios de Molina Mdel C, Miler EA, et al. Antioxidants and methimazole in the treatment of Graves' disease: effect on urinary malondialdehyde levels. *Clin Chim Acta*. 2005;352(1-2):115-120. doi: 10.1016/j.cccn.2004.08.020.
10. Marcocci C, Kahaly GJ, Krassas GE, et al. Selenium and the course of mild Graves' orbitopathy. *N Engl J Med*. 2011;364(20):1920-1931. doi: 10.1056/NEJMoa1012985.
11. Wertenbruch T, Willenberg H, Sagert C, et al. Serum selenium levels in patients with remission and relapse of graves disease. *Medicinal Chemistry*. 2007;3(3):281-284. doi: 10.2174/157340607780620662.
12. Bacic-Vrca V, Skreb F, Cepelak I, et al. The effect of antioxidant supplementation on superoxide dismutase activity, Cu and Zn levels, and total antioxidant status in erythrocytes of patients with Graves' disease. *Clin Chem Lab Med*. 2005;43(4):383-388. doi: 10.1515/CCLM.2005.069.
13. Bulow Pedersen I, Knudsen N, Carle A, et al. Serum selenium is low in newly diagnosed Graves' disease: a population-based study. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2013;79(4):584-590. doi: 10.1111/cen.12185.
14. Calissendorff J, Mikulski E, Larsen EH, Moller M. A prospective investigation of Graves' disease and selenium: thyroid hormones, auto-antibodies and self-rated symptoms. *Eur Thyroid J*. 2015; 4(2):93-98. doi: 10.1159/000381768.
15. Leo M, Bartalena L, Rotondo Dottore G, et al. Effects of selenium on short-term control of hyperthyroidism due to Graves' disease treated with methimazole: results of a randomized clinical trial. *J Endocrinol Invest*. 2017;40(3):281-287. doi: 10.1007/s40618-016-0559-9.
16. Taurog A, Dorris ML, Guziec LJ, Guziec FS. The selenium analog of methimazole measurement of its inhibitory effect on type I 5'-deiodinase and of its antithyroid activity. *Biochemical Pharmacology*. 1994;48(7):1447-1453. doi: 10.1016/0006-2952(94)90569-x.
17. Roy G, Muges G. Selenium analogues of antithyroid drugs-recent developments. *Chem Biodivers*. 2008;5(3):414-439. doi: 10.1002/cbdv.200890042.
18. Mazokopakis EE, Papadakis JA, Papadomanolaki MG, et al. Effects of 12 months treatment with L-selenomethionine on serum anti-TPO levels in patients with Hashimoto's thyroiditis. *Thyroid*. 2007;17(7):609-612. doi: 10.1089/thy.2007.0040.
19. Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with autoimmune thyroiditis. *Eur J Endocrinol*. 2003;148(4):389-393.
20. Karanikas G, Schuetz M, Kontur S, et al. No immunological benefit of selenium in consecutive patients with autoimmune thyroiditis. *Thyroid*. 2008;18(1):7-12. doi: 10.1089/thy.2007.0127.
21. Gartner R, Gasnier BC, Dietrich JW, et al. Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations. *J Clin Endocrinol Metab*. 2002;87(4):1687-1691. doi: 10.1210/jcem.87.4.8421.
22. Anastasilakis AD, Toulis KA, Nisianakis P, et al. Selenomethionine treatment in patients with autoimmune thyroiditis: a prospective, quasi-randomised trial. *Int J Clin Pract*. 2012;66(4):378-383. doi: 10.1111/j.1742-1241.2011.02879.x.
23. van Zuuren EJ, Albusta AY, Fedorowicz Z, et al. Selenium supplementation for Hashimoto's thyroiditis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013(6):CD010223. doi: 10.1002/14651858.CD010223.pub2.

Информация об авторах

***Шабалина Елена Александровна** — аспирант кафедры эндокринологии [Elena A. Shabalina, MD]; адрес: улица Погодинская, д. 1, стр. 1, 119435 Москва, Россия [address: 1-1 Pogodinskaya street, 119435 Moscow, Russia]; e-mail: shabalinaelena@mail.ru

Фадеев Валентин Викторович — д.м.н., профессор, член-корр. РАН [Valentin V. Fadeyev, MD, PhD, Professor]; адрес: 119992, Москва, ул. Погодинская, д. 1, стр. 1. [address: 1-1, Pogodinskaya street, 119992 Moscow, Russia]; e-mail: walfad@mail.ru; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3026-6315>; eLibrary SPIN: 6825-8417.

Как цитировать

Шабалина Е.А., Фадеев В.В. Эффекты селена в составе консервативной терапии болезни Грейвса // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. — 2016. — Т. 12. — №4. — С. XXX-XXX. doi: 10.14341/ket20164XXX-XXX

To cite this article

Shabalina EA, Fadeyev VV. Effects of selenium in patients with Graves' disease treated with antithyroid drugs. *Clinical and experimental thyroidology*. 2016;12(4):XXX-XXX. doi: 10.14341/ket20164XXX-XXX

Рукопись получена: 03.12.2016. **Рукопись одобрена:** 22.12.2016. **Опубликована online:** 20.05.2017.

Received: 03.12.2016. **Accepted:** 22.12.2016. **Published online:** 20.05.2017.